

PECUÁRIA

Saiba eliminar a braquiária no sistema de rotação de culturas

AINDA ABORDANDO A RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS, A EMBRAPA DETALHA ESTE E OUTROS TEMAS NO LIVRO 500 PERGUNTAS - 500 RESPOSTAS

De forma didática continuamos abordando o tema da recuperação de pastagens, em função do Estado conviver com a degradação de seus pastos, um dos mais graves problemas da pecuária regional.

Como eliminar a braquiária na rotação com a agricultura?

Para controlar as braquiárias, bem como grande parte da sementeira do solo, usa-se uma grade pesada no início da seca para matar as plantas estabelecidas. Na primavera, após as primeiras chuvas, prepara-se o solo e planta-se soja, milho ou sorgo. Depois da colheita, em maio, planta-se aveia (*Avena sativa*), milheto (*Penisetum americanum*) ou milho-safrinha (*Zea mays*), usando-se herbicida específico para controlar a braquiária. Repetindo essas operações durante 2 ou 3 anos, consegue-se praticamente eliminar a braquiária do terreno.

Quando usar herbicida para o controle de invasoras na formação de pastagem?

Sempre que houver infestação de plantas invasoras de folhas largas, na implantação de pastagem de gramínea, controle com a aplicação de herbicidas à base de 2,4 D.

O uso de herbicidas e des-



PASTOS. Recuperar a pastagem e a qualidade do solo devem ser objetivo de todo o proprietário rural

secantes, no plantio direto, pode prejudicar a germinação da braquiária semeada após a colheita da lavoura?

Dessecantes usados no plantio direto e herbicidas para uso pós-emergencial das invasoras não interferem na germinação das sementes de braquiária, semeadas após a colheita da lavoura.

Qual o método mais prático e econômico de recuperar pastagens praguejadas por invasoras arbustivas?

Recomenda-se fazer um bom preparo do solo, com aração e gradagem, corrigir a aci-

UMA
das práticas importantes na recuperação de pastos é a sucessão de braquiária com alguma cultura agrícola

dez e as deficiências de fertilidade e, de preferência, plantar uma cultura anual. Após a colheita, preparar novamente o solo e replantar a pastagem. A produção da cul-

tura reduz o custo de recuperação da pastagem.

Como deve ser realizado o descarte das embalagens de agrotóxicos e de produtos veterinários?

Para o descarte das embalagens de agrotóxicos, utilizar as seguintes práticas:

- Armazenar temporariamente as embalagens com suas respectivas tampas e rótulos e, preferencialmente, acondicionadas em caixas de papelão original, em local coberto ao abrigo da chuva e ventilado.
- Efetuar a tríplice lavagem das embalagens rígidas vazias e perfurar o fundo para evitar a sua reutilização, sem danificar o rótulo.
- As embalagens flexíveis vazias devem ser guardadas dentro de uma embalagem de resgate (adquirida no revendedor) devidamente fechada e identificada.
- As embalagens vazias dos produtos veterinários devem ser recolhidas em tambores dispostos em local coberto no curral, para armazenamento provisório.

- Entregar as embalagens vazias ou com prazo de validade vencido na unidade de recebimento indicada no corpo da nota fiscal ou consultar o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev) (<http://www.inpev.org.br>) e outros órgãos estaduais de defesa sanitária e ambiental sobre o destino dessas embalagens.