PECUÁRIA

As novilhas e a estação de monta

CUIDADOS ESPECIAIS NA FASE FINAL DE GESTAÇÃO E SOBRE A NOVA COBERTURA

Damos sequência aos temas ligados à atividade de recria na pecuária bovina. Focamos, desta feita, nos aspectos relacionados às novilhas e seu comportamento na estação de monta. Os cuidados especiais na fase final da gestação e no parto, e do momento mais correto para a cobertura de novilhas de primeira cria.

A estação de monta para novilhas deve ser a mesma das vacas? As novilhas em reprodução podem ficar junto com as va-

cas?

Recomenda-se que o início e o término da estação de monta para novilhas seja antecipado em 30 dias, em relação ao período de monta utilizado para as vacas, uma vez que novilhas de primeira cria apresentam maior intervalo entre partos e o primeiro cio fértil do que o apresentado pelas vacas.

Como as novilhas deverão ser entouradas mais cedo do que as vacas, elas deverão ficar em pasto separado. Além do mais, os touros deverão ser mais leves do que os utilizados para as vacas

Há a necessidade de cuidados especiais na fase final da gestação e no parto das novilhas? O criador deve preocupar-se principalmente com o estado nutricional do rebanho de cria, especialmente no Brasil Central, pois o terço final da gestação coincide

co. Animais que sofrem restrição alimentar durante esse período parem em más condições corporais e apresentam um longo intervalo do parto à

com o período se-

manifestação do primeiro cio.
Em novilhas de primeira cria, o problema é mais grave, pois, além de ter de amamentar suas crias, ainda estão em fase de crescimento, apresentando elevados requerimentos nutricionais durante a fase de lactação. Por ocasião da parição,



NOVILHAS. Cuidados na primeira cria, na hora de ser coberta de novo e a nutrição são imprescindíveis

recomenda-se a utilização de pasto-maternidade, para dar maior assistência às novilhas e facilitar o manejo dos bezerros recém-nascidos.

Quantos dias após o parto as novilhas de primeira cria podem ser novamente cobertas? Se as novilhas forem acasaladas com peso aproximado de 300kg, apresentarem bom desenvolvimento corporal e não sofrerem restrição alimentar durante a gestação, elas poderão retornar ao cio e ser cobertas de 35 a 40 dias após o parto. A frequência e a intensidade de amamentação poderão atrasar consideravelmente o retorno ao cio, principalmente em animais ainda em crescimento e com restrição alimentar durante esse período.

Há a necessidade de suple-

mentar as novilhas na seca? A redução da idade à primeira cria é um dos fatores que contribuiu para o aumento da produtividade da fase de cria. Portanto, para que as novilhas alcancem desenvolvimento adequado em idade precoce, a disponibilidade de forrageiras de boa qualidade, nesse período, é de vital importância.

A redução da carga animal (número de cabeças por hectare), o fornecimento de pastagens de melhor qualidade e mesmo a suplementação alimentar são alternativas que

devem ser consideradas pelo criador, dependendo do sistema de exploração pecuária.

Novilhas mestiças meiosangue são mais precoces e podem entrar em reprodução mais cedo do que as Nelore. Contudo, para expressar maior potencial, elas são mais exigentes em alimentação.

Qual é o melhor sistema de recria de novilhas no Brasil Central?

Na bovinocultura de corte, é prática comum destinar os piores pastos à recria de novilhas. A consequência é a idade elevada idade à primeira cria. O ideal é que também se destinem, às fêmeas em recria postos em quantidade e qualidade necessários ao desenvolvimento normal dos animais. Essa prática, aliada à suplementação alimentar nos períodos de seca, pode reduzir em até 1 ano a idade à primeira cria, aumentar a vida reprodutiva das matrizes e produzir bezerros mais pesados à desmama.

