PECUÁRIA

Mais dicas sobre boa nutrição

O CONTROLE NO CONSUMO DE MISTURA E A ALIMENTAÇÃO PARA OS BEZERROS

Prosseguindo com o tema que estamos abordando a várias semanas – a nutrição de bovinos – hoje, as informações giram em torno do consumo da mistura múltipla, se precisa ou não ser controlada, e, também, para saber quais animais precisam mais de alimento. Vamos, ainda, tratar dos bezerros desmamados, se devem ou não receber ração na idade de três meses.

É necessário controlar o consumo da mistura múltipla pelos animais?
É importante monitorar o consumo, para avaliar se ele está abaixo ou acima, podem ser feitos ajustes na fórmula, particularmente nos níveis de sal e de ureia, para tentar fazer o consumo chegar ao valor desejado.

Qual é a categoria animal que precisa mais de alimento?
Na engorda de novilhos jovens, a exigência alimentar é grande, pois eles têm de manter seu organismo, crescer e engordar. O mesmo acontece com vacas paridas pela primeira vez. Elas têm exigência nutricional para a mantença, para o crescimento (porque ainda são jovens), para a produção de leite e, muitas vezes, também, para a gestação, tudo ao mesmo tempo. Vacas secas, adultas e bois adultos em manutenção têm, baixa exigência alimentar, pois não estão em produção.

DIVULGAÇÃO

A nutrição é um dos pilares mais importantes na criação de bovinos

Bezerros desmamados com 3 meses de idade devem receber ração?
As pastagens tropicais, de maneira geral, não apresentam qualidade suficiente para atender às exigências nutricionais de bezerros desmamados aos 90 dias. Assim sendo, é recomendável a suplementação com concentrado, durante 2 a 3 meses, sob pena de o bezerro ter o seu desenvolvimento comprometido.

Por razões econômicas, deve ser estabelecido um limite na quantidade fornecida (1,0 kg a 1,5 kg) de ração, por 100 quilos de peso vivo, dependendo da qualidade do pasto e do objetivo a ser alcançado.

A desmama precoce como forma de melhorar a condição corporal de matrizes, ao liberá-las da lactação, não é um prática regularmente indicada, pois é perfeitamente possível desmamar animais com 7 meses e vacas com bom estado corporal, apenas se valendo da pastagem adequada e suplementação (sal mineral/sal mineral com ureia).

RAÇÃO é recomendada, pelos especialistas, para os bezerros desmamados aos três meses, a fim de assegurar um bom desenvolvimento