PECUÁRIA

Melhor nutrição para os bezerros

A DESMAMA PRECOCE, A MISTURA MINERAL NA ALIMENTAÇÃO E O CREEP-FEEDING

Continuamos nesta edição a tratar das peculiaridades, cuidados e do dia-a-dia depois do nascimento de bezerros nas propriedades rurais. Do momento mais indicado para fazer a desmama, se é indicado que se promova a desmama precoce. E também detalhes sobre nutrição, como o *creep-feeding* e o *creep-grazing*.

Como substituir o colostro para bezerros criados guaxos (bezerros órfãos ou enjeitados pela mãe)?
Não existe produto capaz de substituir o colostro com a mesma eficiência. Os substitutos do leite encontados no mercado podem auxiliar na criação dos guaxos; porém, esses animais não terão o mesmo desenvolvimento daqueles que mamaram o colostro. Recomenda-se manter um banco de colostro na propriedade, devendo ser armazenado em freezer ou congelador. Quando da sua utilização, o colostro deve ser descongelado em banho-maria em temperatura não muito elevada, e fornecido aos bezerros até 8 horas após o nascimento.

MAIOR garantia para os bezerros desmamados na fase de aleitamento são sistemas especiais como o creep-feeding ou o creep-grazing

Qual é a vantagem e como fazer a desmama precoce?
A baixa taxa de natalidade é um dos principais problemas da criação extensiva de bovinos de corte. Em situações de escassez de forragem, a desmama precoce reduz o estresse da lactação, como também os requerimentos nutricionais da vaca, antecipando assim o restabelecimento da atividade reprodutiva. Como a lactação tem prioridade por nutrientes, em relação ao ciclo estral, vacas secas requerem 40% a 60% menos forragem do que vacas lactantes. A separação do bezerro 3 meses após o nascimento permite que a desmama ocorra ainda dentro da estação de monta, aumentando assim as chances de concepção.

Que cuidados especiais devem ser adotados para com os bezerros? Quando se utiliza a desmama precoce?
Devem ser adotadas as seguintes práticas:
* Usar *creep-grazing* (pasto especial, com acesso somente aos bezerros) ou *creep-feeding* (cocho com ração especial, com acesso somente aos bezerros) por meio dos quais os bezerros se acostumam a ingerir alimentos sólidos antes da desmama.
* Desmamar os bezerros com peso superior a 90 kg.
* Fazer com que a desmama ocorra em época adequada (estação chuvosa) e em pasto apropriado.
* Suplementar a alimentação dos bezerros com ração apropriada, pelo menos até 2 meses após a desmama.
* Evitar distúrbios logo após a separação do bezerro de sua mãe (manejo de mangueiro, transporte, comercialização etc...)

O que é *creep-feeding* e o *creep-grazing*? Como funcionam?
O *creep-feeding* é uma forma prática de se suplementar a alimentação de bezerros na fase de aleitamento. Consiste em cercar uma pequena área dentro do pasto a que só os bezerros tenham acesso, e onde são colocados cochos com ração concentrada.

O *creep-grazing* é uma forma de fornecer forrageira de melhor qualidade aos bezerros em aleitamento. Consiste em cercar uma área dentro da invernada das vacas, de forma que só os bezerros tenham acesso, e introduzir, nessa área, pasto de ótima qualidade, como: colonião bem manejado, *coast-cross*, milheto ou leguminosas, como estilosantes Mineirão ou Leucena.

Qual é a mistura mineral indicada para bezerros? Qual deve ser a composição de ração para bezerros desmamados com 90 dias de idade?
Na fase de aleitamento não há necessidade de suplementar os bezerros, embora eles possam ter acesso à mistura mineral fornecida às mães. Para bezerros desmamados aos 90 dias de idade, bons resultados têm sido obtidos com ração composta apenas de milho mais 21% de farelo de soja e minerais, ou milho mais 2% a 3% de uréia e minerais.

Com que idade os bezerros começam a pastar?
Bezerros de raças taurinas começam a pastar e a ruminar entre 2 e 3 semanas de idade, com um tempo médio de pastejo de 3 horas/dia. Daí até 120 dias de vida, o tempo de pastejo aumenta quase que diretamente com a idade do bezerro. Aos 4 meses, eles pastam durante 38% do dia, ou por um período equivalente a 60% do tempo de pastejo da vaca. Bezerros zebuínos, em sistema extensivo de criação, iniciam a ruminação aos 30 dias de idade.

DIVULGAÇÃO | LIQUIDA NUTRI

NUTRIÇÃO. Bezerros têm sistemas especiais para se alimentarem

Qual é a melhor pastagem (forrageira) para bezerros em aleitamento?
As pastagens para bezerros em aleitamento devem ser espécies de alta qualidade, caracterizadas por elevados teores de proteína, baixos teores de fibras, boa digestão e boa aceitação. Para esse fim, sugere-se o uso de piquetes com capins, como grama *coast-cross*, milheto ou leguminosas como o estilosantes Mineirão ou Lucena. Para bezerros de corte criados a campo, sugere-se o plantio de pequenas áreas, cercadas, dentro da invernada de cria, de sorte que somente os bezerros lhes tenham acesso (*creep-grazing*)