PECUÁRIA

Suplementação para os bezerros

AS PRÁTICAS DE MANEJO SANITÁRIO E IDADE IDEAL PARA CASTRAR DESMAMADOS

Seguimos esta semana com os temas de recria e engorda de bovinos. Serão abordados aspectos importantes como a suplementação de bezerros desmamados na seca, as práticas de manejo sanitário de machos em recria, a idade ideal para castração de novilhos, entre outros assuntos.

USO DO

sal proteinado nos bezerros desmamados melhora a recria. Mas não se deve abusar na suplementação pois o excesso é perdido

Bezerros desmamados devem ser suplementados na seca?

Sim. A suplementação de bezerros com sal proteinado (0,1% a 0,2% do peso vivo - PV), melhora a recria desses animais, pois eles são muito exigentes em proteína e as pastagens nessa época são deficientes desse nutriente. Deve-se evitar suplementações acima de 0,6% PV, pois o ganho obtido pelos bezerros que recebem essa suplementação é perdido ao longo do tempo, caso nada seja feito durante a segunda seca.

Até que idade e em que condições os animais em recria devem ser suplementados na seca?

Geralmente, os animais jovens são mais eficientes em converter o alimento em ganho de peso. Entretanto, não há uma idade máxima a partir da qual não exista resposta à suplementação. O importante é que eles tenham potencial para ganhar peso. Respostas favoráveis à suplementação têm sido obtidas com animais de aproximadamente 350 kg de peso vivo, na entrada da seca.

Nesse caso, ter-se-iam aproximadamente 90 dias de suplementação, com 40 kg a 50 kg de ganho de peso. Esses animais seriam abatidos em fevereiro/março, com aproximadamente 450 kg, liberando a pastagem para ser vedada e utilizada no período seco seguinte.

De que consistem as práticas de manejo sanitário de machos em recria?

As práticas de manejo sanitário recomendadas para machos em recria consistem, basicamente, de:

- Vacinação contra carbúnculo sintomático e gangrena gasosa, por ocasião da desmama e aos 12 meses de idade.
- Vacinação periódica contra a febre aftosa, com vacina oleosa, de acordo com o calendário estabelecido pelo órgão estadual de defesa sanitária animal.
- Vermifugação nos meses de maio, julho e setembro, a partir da desmama até os 2 anos de idade, com vermífugo de largo espectro.
- Combate aos ectoparasitos (berne, carrapato, mosca-do-chifre).

Qual a idade ideal para a castração de novilhos?

Qual o processo recomendado?

A idade de castração dos novilhos está relacionada com o início de sua atividade sexual. Os mestiços normalmente ficam aptos à reprodução com menor idade do que os animais zebuínos e, por isso, devem ser castrados mais novos, com o objetivo de não dificultar o manejo. A castração deve ser feita 6 meses antes da previsão do abate ou aos 18 meses em animais abatidos a partir dos 24 meses.

Dentre os vários processos de castração existentes, o mais recomendado é o cirúrgico (abertura das bolsas escrotais com bisturi ou outra lâmina afiada e extração dos testículos), desde que realizado de acordo com recomendações do médico-veterinário.

ARQUIVO

BEZERROS. Exigências e cuidados devem ser intensos nessa fase