

PECUÁRIA

Mais orientações sobre bezerros

A MELHOR PASTAGEM, A HORA CORRETA PARA A DESMAMA E MUITO MAIS

DIVULGAÇÃO | WWW.CONECTAGRO.COM.BR

O Correio Rural prossegue, nesta edição, abordando o tema bezerros. A melhor hora para a desmama, as causas e como tratar a fotossensibilização, se há ou não vantagens em descornar o bezerro quando bem novo e muitas outras informações importantes. Também será tratado, a partir do livro 500 Perguntas 500 Respostas da Embrapa Gado de Corte, o que é mais indicado para alimentação, vermifugação e as vacinas.

Qual é a melhor pastagem para a desmama de bezerros?

A desmama de bezerros de corte normalmente ocorre no início do período seco, em abril/maio. Neste caso, a pastagem deve ser de espécies capazes de se conservar como o fenem-pé, nesse período, com o máximo de qualidade. Entretanto, sugere-se evitar pastos de *Braquiária Decubens*, pois essa braquiária pode provocar fotossensibilização nos bezerros, o que exigiria outros cuidados.

Resultados de pesquisa indicam que pastagens exclusivas de capim não atendem satisfatoriamente às necessidades nutricionais dos bezerros na fase pós-desmama. O uso dessas pastagens, associadas com leguminosas, tem proporcionado bons ganhos de peso no período seco, em bezerros desmamados. Outra alternativa é recorrer a uma suplementação de baixo consumo, como sal proteico, no período pós-desmama, para evitar a perda de peso.

O que é, qual a causa e como tratar a fotossensibilização em bezerros?

A fotossensibilização hepatógena em bezerros é causada

por um fungo que se desenvolve no material seco do pasto, principalmente em pastagem de braquiária. Ocorre geralmente após a desmama, quando o bezerro passa a se alimentar exclusivamente da pastagem. A primeira providência, nos casos de fotossensibilização, é a mudança dos bezerros para outro pasto de espécie forrageira diferente, que tenha sombra. O tratamento consiste na aplicação de protetor hepático, anti-histamínicos e hidratantes. Nas lesões de pele, devem ser aplicadas pomadas antissépticas e cicatrizantes.

Há vantagem em descornar bezerros quando novos? Qual é o melhor método de descorna: ferro quente ou bastão de soda cáustica?

A descorna tem sido uma prática indicada principalmente para animais mestiços, com o objetivo de facilitar o manejo e evitar ferimentos provocados pelos chifres, notadamente quando a fase de terminação é conduzida em confinamento. Deve ser realizada em bezerros com até dois meses de idade. Após esse período, essa prática fica mais difícil e onerosa, além de causar estresse ao animal.

Os dois métodos de descorna (com ferro quente ou com bastão de soda cáustica) são eficientes quando aplicados em animais jovens; porém, o uso do bastão de soda cáustica requer maior cuidado na realização da prática, e não deve ser usado nos dias em que haja possibilidade de ocorrência de chuvas.

O que é mais indicado para bezerros: feno ou silagem? A



BEZERROS. Orientações garantem sanidade e boa nutrição aos animais recém-desmamados

partir de que idade pode ser administrado?

O feno é mais indicado para bezerros. Deve ter boa qualidade e pode ser oferecido a partir dos 2-3 meses de idade.

A partir de que idade os bezerros devem ser vermifugados? Qual é o melhor vermífugo para bezerros e a forma de aplicação?

Os animais destinados ao abate em criações extensivas, no Brasil Central, devem ser vermifugados a partir da desmama, até a idade de 24 meses, com vermífugos de largo espectro, uma vez que estes atuam contra todas as espécies de vermes. O meio de administração do vermífugo não é importante. O que realmente importa é o princípio

ativo do produto. Mas, nas outras regiões do País, o produtor deve procurar orientação médico-veterinária local.

A partir de que idade os bezerros devem ser vacinados contra o carbúnculo sintomático e a gangrena gasosa?

Pode-se vacinar a partir de 3-4 meses de idade, embora na prática eles seja vacinados aos 6 meses, com um reforço aos 12 meses.

Em áreas de alto risco de ocorrência da doença, recomenda-se vacinar os bezerros a cada 6 meses, até a idade de 2 anos.

Por que novilhas de primeira cria enjeitam seus bezerros? Como evitar que isso ocorra?

Não é comum novilhas de primeira cria enjeitarem bezerros. Por instinto, a grande maioria das novilhas aceita e cuida de suas crias. É difícil saber, antes do parto, se a novilha irá ou não enjeitar o bezerro, o que impossibilita adotar alguma medida especial para evitar que isso ocorra. Entretanto, as novilhas devem permanecer em piquete-maternidade, em lugar calmo, para não ficarem estressadas por ocasião do parto.

Com que idade o bezerro deve ser desmamado? Qual a época de desmama mais indicada para a criação extensiva?

Em sistema extensivo, os bezerros estão desmamados usualmente aos 6-8 meses de idade. Dependendo das condições de pasto, podem ser desmamados aos 5 meses, sem causar prejuízo ao seu desenvolvimento.

PARA

vermifugar os bezerros, a orientação da Embrapa é de que seja feito a partir da desmama e até a idade de 24 meses