

# PECUÁRIA

## O sistema de recria recomendado

### COMO ACOMPANHAR CRESCIMENTO DE NOVILHOS PELAS MUDANÇAS NOS DENTES

AGROVILLE.COM.BR

Proseguimos nesta edição tratando de sistemas de recria de novilhos, mostrando as alterações na dentição dos animais, como se determina a idade dos mesmos pelos dentes, entre outros questionamentos.

**Qual o sistema de recria é recomendado para o gado de corte?**

Devem-se observar as seguintes recomendações:

- Os animais em recria devem ser mantidos em boas pastagens com suplementação mineral adequada. No período seco, devem receber também sal proteinado na quantidade de

0,1% do peso vivo (PV), ou ter acesso durante algumas horas do dia, a uma legumineira ou banco de proteína (área anexa à pastagem cultivada com uma leguminosa, como guandu ou leucena).

**PELOS**  
dentes dos novilhos é possível acompanhar o crescimento dos mesmos e as fases de desenvolvimento dos animais

- Vacinação: por ocasião da desmama, e 6 meses após, com vacina polivalente contra carbúnculo sintomático e gangrena gasosa e, periodicamente, contra a febre aftosa, de acordo com o calendário estabelecido pelo órgão estadual de defesa sanitária animal. As fêmeas devem ser vacinadas também contra a

brucelose, na desmama.



**NOVILHOS.** É importante na fase de recria dos bovinos uma boa pastagem que garanta a nutrição dos animais

- Tanto os machos quanto as fêmeas devem, ainda, receber aplicação de vermífugo de largo espectro nos meses de

maio, julho e setembro, a partir da desmama até que completem 2 anos de idade.

- Sempre que necessário, deve ser feito o controle de ectoparasitos (berne, carrapato e mosca-do-chifre).

*Nota: embora as práticas de manejo sejam as mesmas para os dois sexos, machos e fêmeas devem ser recriados separadamente, a partir de 12-14 meses de idade.*

**Como se determina a idade dos bovinos pela dentição?**

A idade aproximada dos bovinos é determinada pelas mudanças observadas nos dentes incisivos: surgimento, desgaste e queda. A idade da desmama, 7-9 meses, é caracterizada pelo rasamento (desgaste) dos 8 incisivos que surgiram até o 6º mês de vida. Aos 18 meses, todos os incisivos de leite já estão nivelados e começam a cair. Aos 2 anos, estão presentes as duas pinças (incisivos centrais) da segunda dentição. A partir daí, a cada 10-12 meses aparece um par de incisivos definitivos, surgindo dos centrais para os cantos. Os animais com dentição completa (oito

incisivos definitivos), certa de 50/60 meses, são considerados de “boca-feita” ou “boca-cheia”.

**Quando ocorrem as mudas de dentição?**

Nos zebuínos, as mudas ocorrem, em média, nas idades indicadas a seguir:

- As pinças caem aos 20 meses e apresentam-se crescidas aos 2 anos.

- Os primeiros médios aparecem aos 30 meses e estão crescidos aos 3 anos.

- Os segundos médios aparecem aos 42 meses e estão crescidos aos 4 anos.

- Os cantos aparecem aos 52-54 meses e estão crescidos aos 5 anos.

Nos bovinos de origem europeia, as mudas ocorrem, geralmente, mais cedo do que o acima indicado.

**O que caracteriza a unidade animal (UA)?**

Unidade animal (UA) é uma unidade de referência usada para estimar a carga animal ou a lotação de uma pastagem. Corresponde a uma vaca de 450 kg de peso vivo.

**TRANQUILIDADE SEMPRE PERTO DE QUEM VAI MAIS LONGE**

A Repneus foi a primeira certificada pelo INMETRO em Mato Grosso do Sul e busca, a cada dia, aprimorar os seus serviços com processos modernos e de alta tecnologia, que asseguram maior vida útil e o melhor custo-benefício na recapagem dos seus pneus.

**REFORMADORA REGISTRADA INMETRO**

**REPNEUS** (67) 3042-4224

Av. Rodoviária, 14.258 - Campo Grande/MS - repneus@repneus.com.br - www.repneus.com.br