PECUÁRIA

O que deve ser avaliado nas novilhas na hora da reprodução?

DO LIVRO "500 PERGUNTAS - 500 RESPOSTAS" A RESPOSTA DA EMBRAPA

Iniciamos na edição da semana passada a prática de, a cada nova edição, responder algumas perguntas de interesse dos produtores de gado de corte. Tanto as perguntas quanto as respostas constam no livro da Embrapa Gado de Corte 500 Perguntas - 500 Respostas. Nesta semana vamos tratar da avaliação das novilhas na hora da reprodução, da estação de monta para as novilhas e se há a necessidade de cuidados especiais na fase final da gestação e no parto das novilhas.

Pergunta 1 - O que deve ser observado na seleção de novilhas para reprodução?
Quatro aspectos principais devem ser observados:
A ausência de defeitos físicos: além da caracterização racial no caso de rebanhos puros, o importante a considerar na seleção de novilhas para reprodução é a ausência de defeitos físicos e o desenvolvimento ponderal. A primeira seleção pode ser feita na desmama ou aos 18 meses de idade, quando devem ser eliminadas as bezerras portadoras de defeito ou com baixo desenvolvimento ponderal.
- Maturidade sexual: depende da raça e do sistema de criação. Novilhas zebuínas em regime de criação extensiva atingem a maturidade entre 24 e 30 meses de idade, ao passo que novilhas de raças europeias, criadas nas mesmas condições, atingem a maturidade bem mais cedo.
- Peso das novilhas: o peso no entouramento é mais importante do que a idade e deve ser próximo de 300 kg.
- Entouramento: convém entourar o maior número possível de novilhas deixando para se fazer a seleção final após o diagnóstico de gestação, quando, então, devem ser eliminadas aquelas que estiverem vazias e as de baixo desenvolvimento.

LIVRO da Embrapa Gado de Corte entra na sua segunda edição e perguntas e respostas estarão semanalmente aqui

Pergunta 2 - A estação de monta para novilhas deve ser a mesma das vacas? As novilhas em reprodução podem ficar junto com as vacas?
Recomenda-se que o início e o término da estação de monta para novilhas seja antecipado em 30 dias, em relação ao período de monta utilizado para as vacas, uma vez que as novilhas de primeira cria sempre apresentam maior intervalo entre o parto e o primeiro cio fértil do que o apresentado pelas vacas.
Como as novilhas deverão ser entouradas mais cedo do que as vacas, elas deverão ficar em pasto separado. Além do mais, os touros deverão ser mais leves do que os utilizados para as vacas.

Pergunta 3 - Há necessidade de cuidados especiais na fase final da gestação e no parto das novilhas?
O criador deve preocupar-se principalmente com o estado nutricional do rebanho de cria, especialmente no Brasil Central, pois o terço final da gestação coincide com o período seco. Animais que sofrem restrição alimentar durante esse período geram bezerros em más condições corporais e apresentam um longo intervalo do parto à manifestação do primeiro cio.
Em novilhas de primeira cria, o problema é mais grave, pois, além de ter de amamentar suas crias, ainda estão em fase de crescimento, apresentando elevados requerimentos nutricionais durante a fase de lactação. Por ocasião da parição, recomenda-se a utilização de pasto-maternidade, para dar maior assistência às novilhas e facilitar o manejo dos bezerros recém-nascidos.

ARQUIVO

➔ **NOVILHAS.** O início e o término da estação de monta para as novilhas deve ser antecipado em 30 dias

agroexata
precisão em agropecuária
Rua Cora Coralina, 289 - Jardim Umuarama
(67) 3341-0320
www.agroexata.com.br