

PECUÁRIA

O descarte e seleção de novilhas

SAIBA MAIS SOBRE O INTERVALO ENTRE PARTOS, DA DURAÇÃO DA GESTAÇÃO, DO DESCARTE DAS VACAS E DA SELEÇÃO DAS NOVILHAS DE SUBSTITUIÇÃO

Descarte de vacas do rebanho, duração da gestação, seleção de novilhas de substituição. Esses alguns dos temas que trataremos hoje do livro "Gado de Corte - 500 Perguntas 500 Respostas".

Qual é a duração da gestação e qual o intervalo médio entre partos em gado de corte?

A duração média da gestação é de 290 dias. O intervalo médio entre partos depende do sistema de exploração pecuária. Nos sistemas de pecuária extensiva, esse intervalo varia de 20 a 24 meses. No entanto, com a intensificação dos sistemas de manejo e alimentação, esse intervalo pode ser reduzido para 12 a 13 meses, o que causa grande impacto na eficiência reprodutiva do rebanho.

Quais são os principais critérios para o descarte de vacas do rebanho?

A vida útil da vaca de corte pode ir além de 12 anos; no entanto, após 10 anos de idade, a produção de leite entra em declínio e o animal passa a desmamar bezerros mais leves. Considerando-se 4 anos como a idade média do primeiro parto, e o descarte aos 10 anos de idade, a vaca deixa, em média, de 4 a 5 bezerros. Contudo, essa produtividade pode ser melhorada sensivelmente, reduzindo-se a idade à primeira cria e o intervalo entre partos.

Os principais critérios para o descarte de vacas são:

+ **Idade:** após 10 anos, as vacas passam a desmamar bezerros mais leves, que têm, por isso, seu desenvolvimento futuro prejudicado.

+ **Repetição de cio:** apesar de serem cobertas por touros reconhecidamente férteis, há vacas que retornam ao cio repetidamente.

+ **Habilidade materna:** vacas que não são boas mães, ou que produzam pouco leite, contribuem para a mortalidade de bezerros na fase de aleitamento, ou desmamam bezerros muito leves.

O descarte de vacas e a seleção das novilhas de substituição devem ser feitos antes ou depois da estação de monta? Quantas vacas devem ser substituídas anualmente no rebanho de corte?

O descarte de vacas vazias ou de baixa produtividade deve ser efetuado após o diagnóstico de gestação e antes do início do período seco. As novilhas para substituição devem ser selecionadas antes da estação de monta, com base no seu desenvolvimento corporal. Recomenda-se que, a cada ano, sejam substituídas cerca de 15 vacas de cada 100 do rebanho (15%). Dessa forma, as vacas permanecem no rebanho por cerca de 6 anos, sendo descartadas as vacas velhas, as vacas vazias e as com baixa habilidade materna.

Quais são as melhores

MELHOR

época do ano para o nascimento de bezerros é durante o período de seca, ou seja entre os meses de julho e setembro

épocas do ano para o nascimento e a desmama de bezerros?

No Brasil Central, a melhor época do ano para o nascimento de bezerros é durante o período seco (julho a setembro), quando são baixas as incidências de doenças e parasitos. A desmama, aos 6 - 7 meses de idade, pode ser realizada de março a abril, próximo ao início do período seco. Apesar de a época de desmama não ser a mais favorável, a utilização de pastos diferenciados ou a suplementação alimentar dos bezerros desmamados possibilitam a manutenção ou mesmo algum ganho de peso durante o período seco.

Por quanto tempo o touro deve permanecer no rebanho?

A vida reprodutiva dos touros pode ir além de 10 a 12 anos. No entanto, os touros devem ser substituídos ou trocados de rebanho, a cada três anos, para evitar que cubram suas próprias filhas.

DIVULGAÇÃO



BEZERROS. Cuidados são grandes, até sobre melhor tempo para nasce