

PECUÁRIA

Parição, doenças e problemas

OS CUIDADOS COM A VACA NA HORA DE PARIR, OS ABORTOS E A RETENÇÃO DA PLACENTA

Os cuidados que se devem ter na fazenda com as vacas na parição é um dos assuntos que serão tratados hoje neste espaço, dedicado a esclarecer dúvidas ou para orientar os pecuaristas nas suas atividades na criação. Mas outros temas também serão tratados, como os abortos e algumas doenças do aparelho reprodutivo da vaca.

Que cuidados devem ser dispensados às vacas na hora da parição?

Com a proximidade do parto, as vacas devem ser transferidas para o pasto/maternidade, onde possam ser constantemente observadas. Sempre que possível, o parto deve ocorrer sem intervenções; entretanto, deve-se observar se ocorrem problemas, como distocias (parto difícil). Após o parto, deve-se observar se houve a eliminação da placenta, que deve ocorrer num prazo de 12 horas.

Quais as causas de aborto em vacas de corte e

como evitá-las?

Diferentes causas podem acarretar o aborto: traumatismos de manejo, estresse, má nutrição, problemas genéticos e doenças (brucelose, leptospirose, campilobacteriose, rinotraqueíte infecciosa, diarreia bovina de origem virótica, etc.). É importante que as vacas sejam manejadas de modo adequado, com o fornecimento de bom pasto e água, suplementação adequada e orientação veterinária no diagnóstico e no controle de doenças.

As vacas que abortam devem ser descartadas?

Nem todos os abortos são causados por agentes infecciosos. Podem também ser causados por prenhez gemelar, fetos com defeitos genéticos, estresse, toxinas, uso impróprio de medicamentos e até por deficiências ou excessos nutricionais. Portanto, o mais importante é diagnosticar a causa do aborto antes de se tomar qualquer decisão. A identificação da cau-

sa é essencial, tanto para se determinar o que fazer com o animal como para se tomar providências a fim de evitar a disseminação de doenças transmissíveis ao rebanho.

Como fazer o parto de uma vaca que apresenta o feto em posição anormal?

Distocia representa uma ameaça para a vaca e para o bezerro, portanto a presença do médico-veterinário é indispensável. Há também perigo de transmissão de doenças ao homem, durante o auxílio ao parto. Em todos os casos em que o feto se encontra em posição anormal, a primeira alternativa é corrigi-la e, então, usar tração forçada para auxiliar a expulsão do feto. A tração só pode ser feita após a colocação do bezerro na posição adequada. A força de tração deve ser moderada e de acordo com as contrações uterinas. Deve-se também proteger o perineo, para evitar ruptura perineal. Nos casos em que



REPRODUÇÃO

Vaca no segundo estágio do parto, que terminou sem problemas

a correção da posição do feto não for possível, podem ser utilizadas a fetotomia ou a cesariana.

O que fazer no caso de retenção da placenta após o parto?

A retenção de placenta em bovinos ocorre quando os anexos fetais não são expelidos de 10 a 12 horas após o parto. As causas, geralmente, são originadas de alterações inflamatórias ou da ausência de contrações uterinas após o parto. No caso de retenção, deve-se impedir que haja decomposição dessas membranas, retirando-as manualmente ou usando antibióticos. A retirada deve ser feita por médico-veterinário em até 36 horas após o parto, e devem-se tomar cuidados para evitar a hemorragia.

Se a retirada manual da placenta não for feita, a placenta deverá ser expulsa em

aproximadamente 9 dias, efetuando-se tratamentos com antibióticos a fim de evitar as metrites (inflamações do útero), que podem ocasionar infecção geral, levando o animal à morte.

Quais são as doenças mais comuns do aparelho reprodutivo da vaca? Quais as suas principais consequências?

Entre as doenças mais comuns, estão as vaginites, metrites, os cistos ovarianos e as doenças de origem infecciosa, como brucelose, tricomonose, campilobacteriose e leptospirose. As doenças do aparelho reprodutivo da vaca podem dar origem à esterilidade temporária ou permanente e podem afetar todo o trato reprodutivo, desde a vagina até os ovários. As causas podem ser traumatismos, problemas hormonais, inflamações ou infecções.

LEILÃO PANTANAL

Senepol San

E CONVIDADOS

04 DE NOVEMBRO | TERÇA-FEIRA - 20H

35 Fêmeas prenhes ou paridas

02 Reprodutores para central

animais avaliados: 24

PARCELAS

Catálogo online em: www.geneticaditiva.com.br

Organização: Genética Aditiva (67) 3321 5166

Promoção: SENEPOL DA SAN

Transmissão: CANAL DO BOI

Agência: CASANOVA